




Mguu kifundo unatibika!

**Muongozo wa hatua
kwa hatua kwa wagonjwa
wapya wa mguu kifundo**

Tutatembea na wewe



MGUU KIFUNDO

- Hakuna kisababishi maalum kinachofahamika kinachoweza sababisha mtoto kuzaliwa na mguu kifundo. Aidha si kosa la mtu ye yote katika familia.
- Mguu kifundo ni moja ya ulemavu wa kuzaliwa.
- Mguu unakuwa na hali ya tofauti ukilinganisha na miguu ya watoto wengine kwa kuwa mgumu sana na muonekano wa tofauti kabisa.
- Mguu unakuwa umegeuka kiasi kwamba sehemu ya juu ya mguu ina kuwa inaangalia chini na sehemu ya chini ya mguu inaangalia juu.
- Aidha mguu unakuwa umejikunja kuelekea chini na ndio maana kwa jina la kitaalamu ukaitwa MGUU KIFUNDO AU MGUU RUNGU kulingana na muonekano wake kufanania kufundo au rungu.
- Mguu kifundo unaathiri zaidi ya watoto 2 kati ya vizazi 1000 kila mara.
- Mguu kifundo unaweza kujitokeza kwa zaidi ya mtoto mmoja ndani ya familia lakini mpaka sasa hakuna uthibitisho wa kisayansi unao onyesha kama ni ugonjwa wa kurithi.
- Aidha mguu kifundo unawaathiri zaidi watoto wa kiume kuliko watoto wa kike kwa uwiano wa 2 kwa 1.
- Mtoto alie na mguu kifundo ataangaliwa kama ana changamoto nyingine japo kuwa watoto wengi changamoto hii hujitokeza yenye.


MATIBABU YA MGUU KIFUNDO YALIYOTHIBITISHWA ULIMWENGINI NI KUTUMIA MUONGOZO WA PONSETI

MATIBABU YA MGUU KIFUNDO KWA MUONGOZO WA PONSETI

Zaidi ya asimilia 95 ya matibabu kwa njia ya Ponseti yamefanikiwa. Kama muongozo wa matibabu ya PONSETI utafuatwa vyema, basi ni dhahiri mtoto atapona kabisa.


- Chezesha viungo nya mguu taratibu uweze kulainika
- Muhogo utabadilishwa kila wiki ndani ya wiki 4 mpaka 6
- Asili 80 ya watoto wenye mguu kifundo wanahitaji upasauji mdogo wa mshipa wa kisigino
- Baada ya upasauji mdogo wa mshipa wa kisigino, mtoto atafungwa muhogo awamu ya mwisho.
- Mtoto ataaanza kutumia viatu tiba baada tu ya muhogo wa awamu ya mwisho kutolewa.
- Viatu tiba vitavaliwa ndani ya masaa 23 kwa siku, kwa muda wa miezi 3 mwanzo.
- Baada ya miezi 3 kukamilika, viatu tiba vitavaliwa usiku na muda wa mtoto kulala tu kwa siku (masaa 12 hadi 14 kwa siku)
- mtoto atapaswa kuvala viatu tiba mpaka atakapofikisha umri miaka 4

KULAINISHA VIUNGO VYA MGUU NA KUFUNGA MUHOGO/PLASTA



- Muhogo hautamuumiza mtoto wako.
- Muhogo utafungwa kuanzia kwenye vidole mpaka kwenye nyongea, sehemu goti ikiwa imekunjwa.
- Mlete mtoto akiwa na njaa ili wakati wa kufungwa muhogo awe ananyonya, kutampa faraja.
- Muhogo mbichi ni mzito. Kunja taulo kisha uweke nyuma ya magoti yake kumpa egemeo mpaka muhogo ukauke.
- Muhogo utabadilishwa kila baada ya wiki moja, utatolewa katika eneo la kliniki masaa machache kabla ya kufunga mwininge.
- Muhogo utafungwa kila wiki mpaka mguu wa mtoto uwe katika hali ya kawaida.

UPASUAJI MDOGO WA MSHIPA WA KISIGINO



- Watoto wengi wa mguu kifundo wana mshipa mfupi wa kisigino
- Bila upasauji mdogo wa mshipa wa kisigino mtoto atatembelea vidole nya mguu
- Huu ni upasauji mdogo kwenye mshipa wa kisigino cha mtoto mwenye mguu kifundo. Mshipa huu huwa mfupi hivyo upasauji mdogo unalenga kuungeza urefu wake ili kumalizia marekebisho ya mwisho ya Mguu kifundo
- Unafanyika kwa kutumia ganzi ndogo katika eneo la upasauji, inachukua dakika 10 tu
- Baada ya upasauji mdogo, muhogo wa awamu ya mwisho utafungwa na utakaa kwa muda wa wiki 3
- Baadhi ya madaktari hutumia ganzi ya mwili mzima kwa watoto wakubwa
- Unaweza mpa mtoto dawa ya maumivu baada ya upasauji huu


UTUNZAJI WA MUHOGO/PLASTA NYUMBANI



- Hakikisha plasta ni safi na kavu muda wote
- Usimuogeshe mtoto
- Tumia kitambaa chenye sabuni na maji kumsafisha mtoto



- Kagua kama muhogo au plasta kama ina ufa au imematika sehemu yeyote
- Usiweke kitu chochote ndani ya muhogo.



- Unapaswa kuona vidole vya miguu muda wote
- Vidole vinapaswa kuwa na joto la mwili la kawaida na rangi halisi ya ngozi
- Bonyeza vidole kila baada ya masaa kadhaa kuhakikisha mzunguko wa damu upo vizuri



- Unaweza mvalisha mtoto soksi juu ya muhogo kama hali ya hewa ni ya ubaridi
- Weka egemeo (taulo) chini ya magoti ya mtoto kumuwezesha kulala vizuri




CHANGAMOTO ZA MUHOGO/PLASTA

Wasiliana na daktari wako au rudi kliniki ikiwa utaona dalili yoyote kati ya yafuatayo;



KUONDOA MUHOGO



- Homa kali
- Uvimbe juu au chini muhogo ulipofungwa
- Vidole vya miguu kuvimba.
- Muhogo/plasta kubana sana mguu
- Harufu mbaya toka ndani ya plasta/muhogo
- Vidole kupooza au kupoteza joto la mwili
- Vidole vya miguu kupoteza rangi yake ya kawaida
- Mguu kuteleza na kutoka nije ya muhogo/plasta baada ya kufungwa
- Vidole kutoonekana baada ya kufungwa muhogo/plasta
- Muhogo kuharibika na kupoteza ubora wake kabla ya tarehe ya miadi ya kliniki
- Muhogo/plasta kutoka na kuuacha mguu bila marekebisho

Ukiwa kama mlezi au mzazi wa mtoto, unajukumu muhimu katika mafanikio ya tiba ya mtoto (mguu kifundo). Ukiwa una maswali au wasiwasi, tafadhalii wasiliana na mshauri wako wa kliniki au wa wazazi.

TAARIFA ZA KLINIKI



UFUNGAJI WA MUHOGO

1	2	3	4	5
				TAREHE ✓



UFUNGAJI WA MUHOGO

6	7	8	9	10
				TAREHE ✓



KIATU TIBA

1	2	3	4	5
				TAREHE ✓



KIATU TIBA

6	7	8	9	10
				TAREHE ✓